

Dénomination du médicament

NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution Povidone

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours de traitement.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution ?
3. Comment utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Autres médicaments ophtalmologiques - code ATC : S01XA20.
NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution contient de la povidone. Ce composant remplace et joue le même rôle que les larmes.

Ce médicament est utilisé pour traiter la sécheresse de l'œil (traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours de traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution ?

N'utilisez jamais NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution :

- si vous êtes allergique à la povidone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans [la rubrique 6](#).

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution.

Faites attention avec NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution :

- N'avalez pas et n'injectez pas ce médicament.
- Lavez-vous soigneusement les mains avant l'application.
- Evitez le contact de l'embout avec les paupières et ne touchez pas votre ?il avec l'extrémité du flacon, pour éviter le risque de contamination du collyre et de blessure à l'?il.
- Rebouchez le flacon soigneusement après usage.
- Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin.
- Si vous devez utiliser un autre collyre, attendez 15 minutes entre les deux applications. NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution doit toujours être appliqué en dernier.

En cas d'apparition de céphalées, de douleur aux yeux, de troubles de la vision, d'irritation des yeux, de rougeurs persistantes, ou encore si les symptômes persistent ou s'aggravent, arrêtez immédiatement votre traitement par NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution et consultez votre médecin.

Chlorure de benzalkonium

Ce médicament contient 0,0018 mg de chlorure de benzalkonium par dose équivalent à 0,05 mg/ml.

Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact souples et changer leur couleur. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

Le chlorure de benzalkonium peut également provoquer une irritation des yeux, surtout si vous souffrez du syndrome de l'?il sec ou de troubles de la cornée (couche transparente à l'avant de l'?il). En cas de sensation anormale, de picotements ou de douleur dans les yeux après avoir utilisé ce médicament, contactez votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'utilisation de NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution peut être envisagée au cours de la grossesse, si nécessaire.

Allaitement

L'utilisation de NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution peut être envisagée chez la femme en période d'allaitement, si nécessaire.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une vision trouble peut affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Dans ce cas, attendez le rétablissement d'une vision normale avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution contient du chlorure de benzalkonium.

3. COMMENT UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie et fréquence d'administration

Adultes (y compris les personnes âgées)

Appliquez 1 goutte de collyre, 4 fois par jour ou selon la prescription en fonction de la gravité des symptômes.

Appliquez 1 goutte de collyre lorsque les troubles oculaires (sécheresse, brûlures, démangeaisons) se font sentir.

Utilisation chez les enfants

L'utilisation de ce collyre n'est pas recommandée chez l'enfant.

Mode d'administration

Voie locale (voie ophtalmique).

EN INSTILLATION OCULAIRE UNIQUEMENT.

Lors de l'utilisation de ce collyre, veuillez respecter les étapes suivantes :

1. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler le collyre.
2. Après avoir retiré le capuchon, si la bague de sécurité est trop lâche, la retirer avant utilisation du produit.
3. Evitez le contact de l'embout du flacon avec l'œil ou les paupières pour éviter le risque de contamination du collyre et de blessure à l'œil.
4. Tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas en regardant en haut.
5. Déposez une goutte de collyre dans l'espace formé.
6. Rebouchez soigneusement le flacon après utilisation.

Si la goutte de collyre tombe à côté de votre œil, réessayez.

Si vous utilisez d'autres collyres ou pommades ophtalmiques, attendez au moins 15 minutes entre chaque instillation de produit. Les pommades ophtalmiques doivent être appliquées en dernier.

Si vous avez utilisé plus de NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution que vous n'auriez dû
Aucun effet indésirable n'est attendu.

Si vous oubliez d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants, pour lesquels la fréquence est inconnue (ne peut pas être estimée selon les données disponibles), ont été rapportés suite à l'utilisation de NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution :

Affections oculaires

Fréquence indéterminée : vision trouble, douleur oculaire, démangeaisons oculaires, irritation oculaire, sensation anormale au niveau de l'œil, rougeur au niveau de l'œil (hyperémie oculaire), sensation transitoire de brûlure ou de paupières collées.

Affections du système immunitaire

Fréquence indéterminée : réactions d'irritation, réactions allergiques au médicament (hypersensibilité).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:
<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C.

Après première ouverture du flacon : ne pas utiliser au-delà de 4 semaines.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution

- La substance active est :

Povidone..... 5 g

Pour 100 ml de collyre.

- Les autres composants sont :

Acide borique, chlorure de sodium, lactate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, hydroxyde de sodium, chlorure de benzalkonium (voir rubrique 2), eau pour préparations injectables.

Qu'est-ce que NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de collyre.

Flacon de 10 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES ALCON
20 RUE DES DEUX GARES
92500 RUEIL-MALMAISON

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES ALCON
20 RUE DES DEUX GARES
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

ALCON LABORATORIES BELGIUM
LICHTERVELD 3
2870 PUURS-SINT-AMANDS
BELGIQUE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Sans objet.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).